



Zugelassene Impfstoffe Kaninchen

Bezeichnung	Krankheit	Zulassung	Mindestalter	Dauer Schutzaufbau	Dauer Immunität	Intervalle
Cunivak COMBO	Myxomatose + RHD	05.08.2009	6 Wochen	Myxo: 5 Tage RHD: 10 Tage	Mind. 6 Monate	Booster: > 4 Wochen Auffrischung: 6 Monate
Cunivak ENT	Clostridium perfringens Typ A	17.07.2013	3 Wochen	?	?	*5
Cunivak JET	Myxomatose	14.10.2003	4 Wochen	14 Tage	Mind. 6 Monate	Booster: 4 Wochen Auffrischung: 4-6 Monate
Cunivak MYXO	Myxomatose	14.10.2003	4 Wochen	14 Tage	Mind. 6 Monate	Booster: 4 Wochen Auffrischung: 4-6 Monate
Cunivak PAST	Kaninchenschnupfen	01.04.1997	4 Wochen	?	?	Booster: < 2 Wochen Auffrischung: 6 Monate
Cunivak RHD	RHD	11.05.2004	4 Wochen	3-7 Tage	12 Monate	Booster: > 4 Wochen Auffrischung: 6 Monate
Dercunimix	Myxomatose + RHD	20.12.2001	10 Wochen	Myxo: ? RHD: 10 Tage	Myxo: 4 Monate RHD: 12 Monate	Booster: alle 4 Monate Myxo Auffrischung: 12 Monate
Eravac	RHDv2	26.09.2016	4 Wochen	7 Tage	9 Monate	Booster: Keine Angabe Auffrischung: 9 Monate
Filavac VHD K C+V	RHD + RHDv2	13.7.2017	10 Wochen (4 Wochen)	7 Tage	12 Monate	Booster: *6 Auffrischung: 12 Monate
Lapimed Myxo id	Myxomatose	20.12.2001	4 Wochen	?	?	Booster: 6 Wochen Auffrischung: 4 Monate
Lapimed RHD	RHD	08.04.1995	8 Wochen *3	7 Tage	12 Monate	Booster: keiner *1 Auffrischung: 12 Monate
Nobivac Myxo-RHD	Myxomatose + RHD	07.09.2011	5 Wochen	21 Tage	12 Monate	Booster: keiner Auffrischung: 12 Monate





Zugelassene Impfstoffe Kaninchen

Bezeichnung	Krankheit	Zulassung	Mindestalter	Dauer Schutzaufbau	Dauer Immunität	Intervalle
Riemser Myxomatose-Vakzine	Myxomatose	12.02.2004	4 Wochen	14 Tage	Mind. 6 Monate	Booster: keiner * ¹ Auffrischung: 6-9 Monate * ²
Rika-Vacc Duo	Myxomatose + RHD	12.06.2008	6 Wochen	Myxo: 5 Tage RHD: 10 Tage	Mind. 6 Monate	Booster: keiner Auffrischung: 6 Monate
Rika-Vacc Myxo sc	Myxomatose	12.06.2008	4 Wochen	5 Tage	Mind. 6 Monate	Booster: keiner * ⁴ Auffrischung: 6 Monate
Rika-Vacc RHD	RHD	04.09.2003	4 Wochen	3-7 Tage	Mind. 12 Monate	Booster: keiner * ¹ Auffrischung: 12 Monate

*¹ bei starken Infektionsdruck nach 4 Wochen

*² bei starken Infektionsdruck alle 4-6 Monate

*³ bei starken Infektionsdruck 4 Wochen

*⁴ bei starkem Infektionsdruck innerhalb von 6 Wochen

*⁵ Häsin: 1 Woche vor Deckakt, 2 Wochen vor Wurftermin, jährlich; Jungtiere: 3. Lebenswoche, 6. Lebenswoche, jährlich

*⁶ bei Impfung nach der 10. Lebenswoche kein Booster erforderlich

